

「ジョイクル[®] 関節注30mg」を投与される 患者様とご家族の皆様へ

- 投与後数時間は、アナフィラキシーが起こる可能性があります。
- 投与直後から帰宅後にかけて、ご自身の状態をよく観察いただき、体調変化には十分ご注意ください。また、ご家族など周りの方は、帰宅後の患者さんの状態に注意してください。
- 2回目以降の投与でも起こる可能性があります。
- 下記のような症状があらわれた場合には、すぐに医療機関を受診してください。受診の際は、ジョイクル関節注を投与されたことを伝えてください。

◆皮膚症状

皮膚のかゆみ、
じんま疹、
紅斑・皮膚の
発赤 など



◆呼吸器症状

声のかすれ、
くしゃみ、
のどのかゆみ、
唇のはれ、
息苦しさ、
呼吸困難 など




◆循環器症状

頻脈、動悸、
顔色が悪い、
意識の消失、
ふらつき、
めまい など



◆消化器症状

腹痛、
吐き気、
下痢 など



- 特に、顔色が悪い、意識の消失などのショック症状や息苦しさなどは、**緊急性の高い症状です**。このような症状があらわれた場合は救急車を呼ぶなど直ちに対応してください。

【お問い合わせ先】

小野薬品工業株式会社 くすり相談室 フリーダイヤル：0120-886-336
受付時間：9:00～17:00（土日・祝日・会社休業日を除く）